

Vacinação

Assim que você comprar ou ganhar um cachorrinho, convém levá-lo ao Médico Veterinário para uma avaliação geral. Enquanto seu animalzinho não estiver com as vacinas em dia tome cuidado para que ele entre em contato apenas com cães saudáveis e, quando levá-lo na clínica veterinária mantenha-o no colo e distante dos outros cães.

Quadro de vacinação em Cães:

60 dias de idade Vacina Octupla - 1ª dose

90 dias de idade Vacina Octupla - 2ª dose

120 dias de idade Vacina Octupla - 3ª dose

1 semana após a aplicação da 3ª dose da Octupla Vacina Anti-Rábica

OBS: O reforço das vacinas octupla e Anti-rábica deve ser anual.

Veja a seguir as doenças, que são evitadas com a vacinação, e os seus sintomas. Ao menor sinal leve o seu cão a um Médico veterinário, somente ele é capaz de avaliar, diagnosticar e tratar uma doença.

CINOMOSE: Enfermidade infectocontagiosa aguda, sub-aguda ou crônica; febril, particular da família canina entre os animais domésticos. Somente o cão. Sua transmissão se dá por vias respiratórias e digestivas. Na fase aguda o vírus é eliminado intensamente e em abundância pela secreção ocular, urina e fezes.

Manifestação:

1º. fase - digestiva: em que o animal apresenta vômitos, diarreia, mucosa sanguinolenta, anorexia, temperatura acima de 40°C.

2º. fase - respiratória: Broncopneumonia intensa, secreções mucosas e senomucosas, que depois passam para purulentas, geralmente por infecções secundárias.

3º. fase - nervosa: Nesta fase aparecem alterações mioclonais (tic nervoso), podendo encontrar as três fases ou apenas uma delas. A mais perigosa é a nervosa. Toda vez que suspeitar de cinomose ou leptospirose, a temperatura deverá estar acima de 40 °C.

HEPATITE: Enfermidade infectocontagiosa aguda, causada por vírus resistente ao éter, álcool, clorofórmio e sensível ao formol e calor. Período de incubação: 4 a 9 dias.

Manifestação:

Animais jovens: morte súbita sem nenhum sinal clínico.

Primeiro sinal: hipertemia passageira de 24 a 48 horas, temperatura de 40º a 40,5º, caindo logo após; apresenta sede intensa, anorexia, congestão das amígdalas, congestão das mucosas e da faringe, congestão conjuntival (pálpebras vermelhas), congestão da conjutiva nasal e bucal, fotofobia, hemorragias bucais, esquimosos na pele (pinta ou pontos vermelhos). Principalmente na frente (abdômen) e faces internas da coxa e mucosa peniana, dispinéia (dificuldade respiratória) por edema pulmonar (pulmão cheio de líquidos), animais adotam posição de sentar, para aliviar a pressão.

LEPTOSPIROSE: Doença infecciosa grave que atinge os homens e os animais, sendo causada por uma bactéria a *Leptospira* sp presente na urina dos ratos e camundongos. A contaminação se dá quando o animal, ou o indivíduo entra em contato com água ou lama que contenha a *Leptospira*. Esta penetra no organismo através de ferimentos na pele ou mesmo na pele íntegra quando num contato mais prolongado e também pelas mucosas (boca - nariz - olhos - órgãos genitais).

Manifestação:

Vômitos e diarreia as vezes com sangue, urina com sangue, icterícia.

PARAINFLUENZA: Tosse persistente, e as vezes associado a pneumonia. Esta doença é chamada tosse de canis.

PARVOVIROSE: Doença de cães seria e altamente contagiosa, e a infecção se dá pelo Parvovirus Canino que tem um curto período de incubação.

Manifestação:

Os sintomas mais comuns são de morte súbita quando tivermos o modo cardíaco, com depressão e disfunções respiratórias. Vômitos, diarreias e desidratações são os sintomas do modo gastrointestinal que tem como sinal principal fezes sanguinolentas.

CORONAVIROSE: Doença viral, com um quadro semelhante à Parvovirose.

RAIVA: Doença infecto contagiosa aguda e fatal, caracterizada por sinais nervosos, apresentados por agressividade e por semi-paralisia ou paralisia. Tempo de incubação: pode aparecer de 10 a 90 dias.

Fonte: Saúde Animal